



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA SALA DE IMUNIZAÇÕES

Data Emissão: 20/07/2019	Próxima Revisão: 30/06/2020	Páginas: 01 a 02	Versão: Nº 01
-----------------------------	--------------------------------	---------------------	------------------

### **Atividade: Administração de vacina via subcutânea (SC).**

Executante: Enfermeiros e Técnicos de enfermagem.

### **Apresentação:**

Nesta via a vacina é introduzida na hipoderme. O volume máximo a ser administrado é de 1,5 ml. Alguns locais são mais utilizados para a vacinação por via subcutânea, como a região do deltoide no terço proximal; a face superior externa do braço; a face anterior e externa da coxa; e a face anterior do antebraço.

### **Resultados esperados:**

Orientar corretamente sobre a técnica de vacinação visando assim à diminuição de Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV).

### **Materiais necessários:**

1. Algodão;
2. Seringa (1,0 mL ou 2,0 mL)
3. Agulha pequena (entre 3 mm e 20mm de comprimento) e fina (4dec./mm e 6dec./mm de calibre) com bisel curto.

### **Procedimento para administração:**

- Higienize as mãos;
- Cheque o imunobiológico a ser administrado, assim como o usuário que irá recebê-lo;
- Prepare a vacina conforme a sua apresentação;
- Escolha o local para a administração da vacina, evitando locais com cicatrizes, manchas, tatuagens e lesões;
- Faça a limpeza da pele com algodão seco;
- Coloque o usuário em posição confortável e segura (na vacinação de crianças, solicite ajuda do acompanhante na contenção para evitar

movimentos bruscos);

- Pince o local da administração com o dedo indicador e o polegar, mantendo a região firme;
- Introduza a agulha com bisel para baixo, com rapidez e firmeza, formando um ângulo de 90°;
- Não aspire o local;
- Injete a solução lentamente;
- Retire a seringa com a agulha em movimento único e firme;
- Faça leve compressão no local com algodão seco;
- Despreze a seringa e a agulha utilizadas na caixa coletora de perfurocortante;
- Higienize as mãos.

**Observações:**

- O álcool comum não deve ser utilizado pela sua baixa volatilidade (demora a secar) e pelo seu baixo poder antisséptico;
- Em situações excepcionais, quando não houver água e sabão na zona rural e em ambiente hospitalar, utilize o álcool a 70%;
- Quando usar o álcool a 70% para a limpeza da pele friccione o algodão embebido por 30 segundos e, em seguida, espere mais 30 segundos para permitir a secagem da pele, deixando-a sem vestígios do produto, de modo a evitar qualquer interferência do álcool no procedimento;
- Comunique a enfermeira responsável pela sala de vacinas para notificação de reações adversas.

<b>Preparado por:</b> Nair Olivia Dieckel e Núbia Toniazzo dos Santos.	<b>Revisado por:</b> Nair Olivia Dieckel e Núbia Toniazzo dos Santos.	<b>Aprovado:</b> Samantha Larissa Torres.
--	---	---